



EL CIERVO

(*Cervus elaphus*)

Es el cérvido de mayor tamaño. El color de su pelaje varía levemente según la estación, desde pardo-rojizo en verano a grisáceo en invierno. Hay una gran diferencia entre los machos y las hembras: los machos son más grandes y lucen una cuerna ósea, que renuevan cada año mientras que las hembras no presentan cuernos. La caída de los cuernos o "desmogue" se produce en marzo, comenzando de inmediato el crecimiento de la nueva, que se completa en julio y varias semanas después se produce la "limpia" o caída del terciopelo.

El celo (la berrea) tiene lugar entre septiembre y octubre. Los machos dejan su grupo y se trasladan a zonas clásicas de berrea (Suelen ser praderas abiertas) pudiendo seguir dos estrategias: perseguir a un grupo de hembras manteniendo alejados a los competidores, o bien defender un terreno, cortejando a las hembras que lo utilicen. Durante el mes que dura el celo los machos están activos todo el periodo mientras que las hembras tienen ciclos de 18 días.



CURIOSIDADES

El berreo de los machos en la época de celo es lo que atrae a las hembras y estimula su estro. Se han hecho estudios en lo que se generaba el ruido de la berrea de forma artificial, sin haber machos presentes y aun así las hembras eran estimuladas.