



## EL CIERVO (*Cervus elaphus*)

Es el cérvido de mayor tamaño. El color de su pelaje varía levemente según la estación, desde pardo-rojizo en verano a grisáceo en invierno. Hay una gran diferencia entre los machos y las hembras: los machos son más grandes y lucen una cuerna ósea, que renuevan cada año mientras que las hembras no presentan cuernos. La caída de los cuernos o "desmogue" se produce en marzo, comenzando de inmediato el crecimiento de la nueva, que se completa en julio y varias semanas después se produce la "limpia" o caída del terciopelo.

El celo (la berrea) tiene lugar entre septiembre y octubre. Los machos dejan su grupo y se trasladan a zonas clásicas de berrea (suelen ser praderas abiertas) pudiendo seguir dos estrategias: perseguir a un grupo de hembras manteniendo alejados a los competidores, o bien defender un terreno, cortejando a las hembras que lo utilicen. Durante el mes que dura el celo los machos están activos todo el periodo mientras que las hembras tienen ciclos de 18 días.



## CURIOSIDADES

El berreo de los machos en la época de celo es lo que atrae a las hembras y estimula su estro. Se han hecho estudios en lo que se generaba el ruido de la berrea de forma artificial, sin haber machos presentes y aun así las hembras eran estimuladas.