

LIEBRE (*Lepus sp.*)

Tienen un tamaño superior a los conejos con patas y orejas largas.

Se pueden distinguir dos tipos de liebre en Redes: la liebre europea (*Lepus europaeus*) y la liebre de piornal (*Lepus castroviejoi*). Se caracterizan porque el extremo de las orejas es de color negro. El cuerpo es pardo amarillento a excepción de la zona ventral, de color blanco y la cola, blanca y negra. Para diferenciarlas hay que fijarse en la banda facial de color blanquecino que tiene la liebre de piornal y no la europea. Además la zona ventral blanca es más grande en la de piornal que en la europea.



Liebre europea



Liebre de piornal

El periodo de reproducción se extiende entre enero y octubre. El celo tiene lugar durante la noche. Suele ser colectivo. La hembra tiene un movimiento característico de la cola, lo que unido al olor que desprende por la glándula inguinal, incita a los machos a perseguirla.

Las plantas herbáceas constituyen la mayor parte de la alimentación de las liebres a lo largo de todo el año. A finales de verano y principios del otoño aumenta el consumo de semillas y comen algún fruto. En invierno consumen cortezas y raíces e incluso cereales cuando se encuentran cerca de zonas agrícolas.

CURIOSIDADES

- La liebre europea tiene la peculiaridad de poseer en sus extremidades anteriores 5 dedos y en las posteriores sólo 4.
- La liebre de piornal es un endemismo ibérico y actualmente su distribución está restringida a la Cordillera Cantábrica.